



質問コーナー

当院ホームページに寄せられたメールでのお問い合わせの中から、よくある質問にお答えしていくコーナーです。

Q. 始めまして。自分は『変形性頸椎症』で、投薬治療を約2年続けています。最近知った事なのですが、『神経ブロック注射』を打つ事で症状が改善すると聞きました。又は注射と薬の併用で改善するとか・・・？
そこで質問ですが、私は頸椎に注射する事に抵抗を感じているのですが、『神経ブロック注射』を打つ前に、笑気ガスや血管注射などで痛覚をマヒ又は緩和させてから『神経ブロック注射』を打つ事は出来ますか？診察を受けてた上で、インフォームド・コンセント後に実施と言う事に成るとは思いますが、ご返答の程宜しく願います。

A. 頸椎症に対して行うブロック療法にもいく種類があります。効果があれば内服などの他の治療と併用することが可能です。しかし、ブロックをする際に笑気ガスを吸って意識がなくなったり痛覚を麻痺させると、的確なところに刺入することができず、ブロックを施行することは困難となります。
いずれにせよ、ブロックの適応があるかどうかは症状によります。



Q. 私の息子(1月で4歳になります)の事なのですが、幼稚園の先生から歩き方や走り方が少しおかしいのでは？と言われてしまいました。安定感がなく、よくフラフラとしています。それによく転びます。
一度病院で診てもらおうかと考えております。もし異常があるのならレントゲンを撮れば分かるものなののでしょうか？
教えてください。よろしくお願いします。

A. 幼児の歩容障害にはいろいろな原因が考えられます。レントゲンをお撮りすることで異常があれば確認することができます。一度診察させていただければと思います。

